

INFORMĀCIJA UN PIEKRIŠANA

krāsvielu permanentai ievadīšanai cilvēka ādā dekoratīvos nolūkos.

Es piekritu tetovējuma saņemšanai.

Tetovējums tiks īstenots tikai gadījumos, kuros nav noteiktas kontraindikācijas, kas aizliedz iegūt tetovējumu. Tāpēc patiesas atbildes uz jautājumiem šajā dokumentā ir priekšnoteikums pirms procedūras. Jebkurš tetovējums ir manis paša izvēle un risks.

Sieviete Virietis

Vārds: _____

Uzvārds: _____

Dzimšanas datums: _____

Adrese: _____

Telefons: _____

E-pasts: _____

Datums: _____

Meistars: _____

Motīvs: _____

Ķermeņa daļa: _____

Es uzmanīgi izlasīšu sekojošo informāciju pirms pieraksta studijā. Neskaidrību gadījumā es vērsīšos pie tetovēšanas meistara, lūdzot detalizētu informācijas izklāstu pirms tam vai pieraksta dienā. Nopietnu jautājumu gadījumā (t.sk. par alerģiskām reakcijām uz tintes sastāvu) primāri ir ieteicams vērsties pie sava ģimenes ārsta.

VESELĪBA UN KONTRINDIKĀCIJAS

Uz zemāk esošajiem jautājumiem es atbildēšu patiesi un piesardzīgi, nodrošinot veiksmīgu jebkāda veida kontraindikāciju identificēšanu, kā arī risku apzināšanu, ko iespējams priekšlaicīgi novērst.

Lūdzu, norādi, ja tev ir kādas no šīm diagnozēm vai pazīmēm:

alerģijas	<input type="checkbox"/> jā	<input type="checkbox"/> nē	_____
autoimūnās slimības	<input type="checkbox"/> jā	<input type="checkbox"/> nē	_____
iedzimts imūndeficīts	<input type="checkbox"/> jā	<input type="checkbox"/> nē	_____
hemodilūcijas terapija	<input type="checkbox"/> jā	<input type="checkbox"/> nē	_____
hroniskas/akūtas infekcijas	<input type="checkbox"/> jā	<input type="checkbox"/> nē	_____
drudzis	<input type="checkbox"/> jā	<input type="checkbox"/> nē	_____

hemofilija / asiņošana	<input type="checkbox"/> jā	<input type="checkbox"/> nē	_____
ādas slimības (ja ir, tad kādas?)	<input type="checkbox"/> jā	<input type="checkbox"/> nē	_____
veneriskās saslīmšanas	<input type="checkbox"/> jā	<input type="checkbox"/> nē	_____
imūndeficīta slimības	<input type="checkbox"/> jā	<input type="checkbox"/> nē	_____
hepatīts A, B, C, D, E, F	<input type="checkbox"/> jā	<input type="checkbox"/> nē	_____
HIV infekcija / HIV-pozitīvs	<input type="checkbox"/> jā	<input type="checkbox"/> nē	_____

diabēts	<input type="checkbox"/> jā	<input type="checkbox"/> nē	_____
medikamenti (ja jā, tad kādi?)	<input type="checkbox"/> jā	<input type="checkbox"/> nē	_____
narkotikas / alkohols (cik daudz lietots?)	<input type="checkbox"/> jā	<input type="checkbox"/> nē	_____

grūtniecība	<input type="checkbox"/> jā	<input type="checkbox"/> nē	_____
mazuļa barošana ar krūti	<input type="checkbox"/> jā	<input type="checkbox"/> nē	_____

citas veselības problēmas	<input type="checkbox"/> jā	<input type="checkbox"/> nē	_____
---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------

Ja mans veselības stāvoklis mainās laika posmā līdz tetovēšanas procedūrai, un iepriekš norādītā informācija vairs nav aktuāla, es ziņošu par to nekavējoties, negaidot meistara uzacīnājumu un jautājumus.

Es saprotu, ka tetovējums netiks realizēts šādos kontraindikāciju gadījumos: hemofilija, diabēts, hepatīts, HIV, ādas saslīmšanas, ekzēma, noteiktas alerģijas, iedzimts imūnais deficīts, jebkāda veida imūnsupresija, autoimūnās slimības, epilepsija, hemodilūcijas terapija, veneriskās saslīmšanas, drudzis, gripa, specifiski medikamenti (piemēram, antikoagulantī), grūtniecība, mazuļa barošana ar krūti.

INFORMĀCIJA PAR BLAKUSPĀRĀDĪBĀM, ĀRSTĒŠANA, TETOVĒJUMA NOŅEMŠANA

Iespējamās nevēlamās reakcijas tetovēšanas laikā un pēc tās

Tetovēšana ir ne visai patikama ieviešanas cilvēka fiziskā ķermeņa integritātē. Es saprotu, ka pat ar vislielāko rūpību procesā un pēc tā un nevainojamu tetovēšanas tehniku nevar pilnīgi novērst medicīniskos riskus, tādos kā ādas kairinājums un iekaisums, rētu veidošanās ap tetovējumu un tā audu perifēriju, kā arī alerģiskas reakcijas. Šādi medicīniskie riski ir retāk, tomēr tie var novest pie tā, ka skartās ķermeņa daļas nepieciešams ārstēt ar medikamentiem vai pat ķirurģiju. Tetovēšanas meistars izmanto tikai sterilus vienreizlietojamus materiālus un sterilizējamus priekšmetus un tetovēšanas aprīkojumu, kas ir testēts speciālā laboratorijā un apstiprināts Eiropā (tintes, kas ir saskaņā ar REACH regulu). Lai vai kā, tomēr, ievērojot drošības noteikumus, nevar pilnībā izslēgt atlikušos alerģiskos riskus. Tetovēšanas procesā ādas otrajā slānī (dermis) tiek ievadīta tinte. Daļu no krāsvielas satura apstrādā limfātiskā sistēma, kur tintes pārpalikumi nogulsnējas limfmezglos un citos orgānos. Saskaņā ar zinātnes un medicīnas sasniegumiem nevar izslēgt šāda procesa nelabvēlīgu ietekmi uz veselību, tomēr ir mainīgie faktori, kas samazina vai palielina nelabvēlīgo ietekmi. Tāpēc jāņem vērā tas, cik liels tetovējums tiek veidots, kāda ir motivācija to iegūt, kādi ir bijuši cilvēka paradumi pirms tā izveidošanas, un kādas izvēles tiek veiktas nākotnē. Ja tetovēšanā tiek izmantoti dažādu krāsu pigmenti, jo īpaši sarkana krāsa, alerģiskas reakcijas un iekaisumi var rasties biežāk, nekā izmantojot melno krāsu. Tetovēšanas laikā vai pēc tās var rasties tādas ķermeņa reakcijas kā apsārtums, pietūkums, iekaisums, alerģiskas un iekaisuma reakcijas, asiņošana. Šos medicīniskos riskus, īpaši ādas kairinājumu un iekaisumu, kā arī rētu veidošanos tetovējuma rajonā un tā audu perifērijā, kā arī citas iespējamās fiziskas reakcijas (piemēram, alerģijas) uz tetovējumu vai izmantotajām krāsvielām un materiāliem nav iespējams iepriekš pārliecinoši paredzēt. Ja rodas neskaidrības un nepārliecinātība saistībā ar medicīniskajiem riskiem, vēlams apmeklēt dermatologu.

Ja tiek veidots vecāka tetovējuma aizsegš (cover-up), var rasties alerģiska/toksiska ādas reakcija, jo vecajā tetovējumā izmantotā krāsa un tās konsistence ir nezināma. Magnētiskās rezonanses izmeklējuma (MRI) gadījumā tetovētājās ķermeņa daļās var rasties sarežģījumi, ja izmantotās tintes neatbilst standartam. Ir zinātniski pierādīts, ka, izmantojot Eiropā apstiprinātas augstas kvalitātes krāsvielas, problēmas nerodas. Ja tiek izmantotas Eiropā neapstiprinātas krāsvielas, kas var būt piesārņotas ar smagajiem metāliem, vai, ja MRI tiek veikts nepareizi, var rasties apsārtums un siltuma uzkrāšanās, iespējami pat viegli apdegumi. Tetovējuma vietā nav ieteicams veikt epidurālo anestēziju (epidurālā anestēzija ir spinālā anestēzija, kur adatu ievieto mugurkaula kanālā vai tā tuvumā, lai injicētu sāpēšanas līdzekli). Gadījumos, kad tetovējums nav pilnībā klājošs un tas ir sadzījis, šī riska aktualitāte samazinās līdz minimumam.

